



## Patienteninformation zur Behandlung von Krätze (Scabies)

### 1. Erwachsene (ab 14 Jahren, ausser schwangere Frauen)

Anwendung von Permethrin (Infectoscab®) auf den ganzen Körper, abends nach dem Duschen, ausser auf den Kopf. Speziell zu behandeln sind die folgenden Stellen:

❖ Zehen und Finger Zwischenräume	❖ Handgelenke
❖ Ellbogen	❖ Bauchnabel
❖ Gesässfalte	❖ Achselhöhlen
❖ Brustwarzenregion bei den Frauen	❖ Genitalregion bei den Männern
❖ Fussgelenkregion	

#### Vorgehen:

- ❖ Belassen Sie das Produkt auf den behandelten Stellen für 12 Stunden und wiederholen Sie die Anwendung nach einer Dusche mit lauwarmem Wasser während 2 aufeinander folgenden Abenden.
- ❖ Nach dem Duschen, ziehen Sie saubere Unterwäsche an und wechseln die Bettwäsche.
- ❖ Nach dem Händewaschen während der Behandlung, applizieren Sie erneut Permethrin auf die gewaschenen Stellen.

### 2. Kinder über 5 Jahre

- ❖ Anwendung von Permethrin (Infectoscab®) zwischen 6 bis 12 Stunden.

**Achtung: Keine Anwendung von Permethrin auf Schleimhäute, Lippen, Mund oder Augen**

### 3. Schwangere Frauen, Babys und Kinder unter 5 Jahren

- ❖ Anwendung von Permethrin (Infectoscab®) auf den ganzen Körper ausser dem Kopf.
- ❖ Belassen Sie das Produkt während 12 Stunden auf dem Körper. Ziehen Sie nach dem Duschen frische Kleider an und wechseln Sie die Bettwäsche.
- ❖ Erneute Applikation auf das Gesäss der Babys nach dem Windelwechseln und nach jedem Händewaschen.

#### Zusätzliche Massnahmen:

- ❖ Gleichzeitige Behandlung von allen Leuten, die im gleichen Haushalt wohnen.
- ❖ Keine sexuelle Beziehung während der Behandlung mit jemandem, der nicht behandelt wird.
- ❖ Nicht das gleiche Bett benützen wie eine andere Person, die nicht behandelt wird.
- ❖ Wechseln von Unterwäsche, Socken und Bettwäsche nach der letzten Dusche nach Beendigung der Behandlung und Waschen von allen Sachen bei 60 Grad in der Waschmaschine.
- ❖ Andere schon gereinigte und gewaschene Kleidungsstücke müssen nicht gewaschen werden.
- ❖ Wenn der Patient in einem Bett ohne Bettlaken schläft, muss auch die Matratze und der Überzug desinfiziert werden mit z.B. Bio Kill Insektenspray oder einem anderen Produkt gegen Parasiten.
- ❖ Die Übertragung erfolgt über engen Körperkontakt; Bettwäsche und Unterwäsche.

